

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών»

ΣΧΕΤ.:

1. Το άρθρο 33 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1Α/5.1.1999)
2. Η με αρ. Φ7/οικ. 1624 (ΦΕΚ 2053Β/24.11.1999) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας
3. Τα από 6/12/2007 και 22/1/2008 Ενημερωτικά Σημειώματα της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Τα από 11/4/2007 (5η Συνεδρίαση), 5/10/2007 (6η Συνεδρίαση) και 4/12/2007 (7η Συνεδρίαση) Πρακτικά της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από σχετικές γνωμοδοτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σχετ. 3 & 4), επήλθαν αλλαγές στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και **εισήχθη το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)**.

Στα πλαίσια αυτά επισυνάπτονται, προς ενημέρωσή σας και πιστή εφαρμογή, ο Πίνακας του νέου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών με τις σχετικές επεξηγήσεις, οι Πίνακες που αφορούν το πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών και 7-18 ετών, που δεν εμβολιάσθηκαν στη συντομότερη από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ηλικία με τις σχετικές επεξηγήσεις, καθώς και ερμηνευτικές επεξηγήσεις που αφορούν το νεοεισαχθέν εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Όλα τα ανωτέρω συνημμένα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΥΚΑ (www.mohaw.gr).

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι ανασφάλιστες ομάδες του πληθυσμού και οι άποροι θα καλύπτονται πλήρως από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο Υπουργός Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ. Αβραμόπουλος

* * *

Εικ. 1. Χρονοδιάγραμμα εμβολισμών για παιδιά και εφήβους

Ηλικία Εμβόλιο	Γένωση	1 μην.	2 μην.	4 μην.	6 μην.	12 μην.	15 μην.	18 μην.	24 μην.	4-6 ετ.	11-12 ετ.	13-18 ετ.
Ηπατίτιδας Β (Hep B) ¹	Hep B1α ^a	Hep B1β (1-2 δόσεις)	Hep B ^b	Hep B ^b	Hep B	Hep B	Hep B	Hep B	Hep B	Hep B (όλες οι δόσεις)		
Διφθερίτιδας, Τετανού, Κοκκύτη (DTaP) ²		DTaP	DTaP	DTaP			DTaP			DTaP		TDaP ^{c,2β}
Πολυομελίτιδας (IPV) ³			IPV			IPV				IPV		
Αιμόφλου τύπου B ⁴			Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib	Hib			
Μηνυγγιτιδόκοκκου C (MC) ⁵		MCC	MCC	MCC						MCC		
Πνευμονόκοκκου (PCV) ⁶		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV (PPV) ^{6a}		
Ιλαράς, Γαρωτίτιδας, Ερυθρός (MMR) ⁷						MMR				MMR		
Ανεμυσυλογίας (MAR) ⁸						Var				Var		
Ιός ανθρακινων θηλωμάτων (HPV) ⁹											HPV	Κοριτσιά 12-15 ετ. 3 δόσεις
Ηπατίτιδας Α (Hep A) ¹⁰										Hep A (2 δόσεις)		
Φυματίωσης (BCG) ¹¹										Mantoux	Mantoux ^{11a} BCG	Mantoux ^{11b}
Γρύπης (INF _L) ¹²											INF _L (επιθίωση)	

Τα εμβόλια κάτω από τη διακοπμένη γραμμή συνιστώνται για επιλεκτικό εμβολιασμό (βλέπε επεξηγήσεις πηγ. εικ. 1)

Εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολίου που γίνονται σ' αυτό το εύρος ηλικιών, σταν συνει περισσότερες από μία.
Το εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολίου δινει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμεται μονοδόντινα ή πολυδόντινα (συνδυασμένα) εμβόλια ή/και συνδυασμός μονοδόντινων-ουσιδύντινων

Εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολίου πάντα αυτός, δεν έχει προηγηθεί κατά το συνιστώμενο σχήμα ως ηρας την ηλικία και τις δόσεις (βλέπε επεξηγήσεις πηγάκων 1 και 2)

Επεξηγήσεις Εικόνας 1

1. HepB = Ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας B.

1α. Η 1η δόση του **HepB** χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση μόνον όταν η μητέρα είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου (**HBsAg**) ή όταν είναι άγνωστο αν η μητέρα είναι φορέας ή όχι. Στην περίπτωση αυτή αναγκαστικά η 1η δόση του HepB χορηγείται ως μονοδύναμο εμβόλιο.

1β. Στην περίπτωση που η 1η δόση χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση, ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά 4 δόσεις αντί 3 δόσεις (η 2η στο τέλος του 1ου μήνα και η 3η στο τέλος του 2ου μήνα). Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης καθώς και 2ης και 3ης δόσης είναι 4 εβδομάδες. Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ προτελευταίας (3ης) και τελευταίας (4ης) δόσης του βασικού εμβολιασμού είναι 8-16 εβδομάδες και δεν χορηγείται νωρίτερα από την ηλικία των 24 εβδομάδων (6 μηνών). ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που το εμβόλιο της ηπατίτιδος B χορηγηθεί ως συνδυασμένο εμβόλιο, ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι τα συνδυασμένα εμβόλια δεν χορηγούνται πριν από την 6η εβδομάδα της ζωής. Επομένως το ελάχιστο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση, που χορηγείται το μονοδύναμο εμβόλιο της ηπατίτιδας B, είναι 6 εβδομάδες αντί 1 μήνας.

Παράλληλα με την 1η δόση του εμβολίου, σ' όλα τα νεογνά μητέρων φορέων του επιφανειακού αντιγόνου και μέσα στις πρώτες 12 ώρες μετά τη γέννηση, χορηγούνται 0,5 ml υπεράνοσης ανοσοσφαιρίνης για ηπατίτιδα B. Η ένεση γίνεται σε διαφορετικό μέρος απ' αυτό που έγινε (ή θα γίνει) το εμβόλιο. Όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες φορείς και πήραν το εμβόλιο και την υπεράνοση ανοσοσφαιρίνη πρέπει να ελέγχονται για επιφανειακό αντιγόνο (**HBsAg**) και αντισώματα (αντι-HBs) στην ηλικία των 9 έως 15 μηνών.

Όταν η μητέρα είναι άγνωστο αν είναι ή όχι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου κατά τον τοκετό και στη συνέχεια αποδειχτεί ότι δεν είναι, από τη 2η δόση και πέρα ακολουθείται το σχήμα του εμβολιασμού που ισχύει για τα νεογνά μητέρων που δεν είναι είναι φορείς του HBsAg, δηλαδή αγνοείται η 1η δόση.

1γ. Όταν η μητέρα είναι αρνητική για επιφανειακό αντιγόνο, ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει 3 δόσεις (δύο αρχικές με μεσοδιάστημα 6-8 εβδομάδων και μια τρίτη σε ηλικία 6-18 μηνών με ελάχιστο μεσοδιάστημα από τη 2η δόση 8-16 εβδομάδες και όχι νωρίτερα από την ηλικία των 6 μηνών).

2. DTaP = Εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη που περιέχει τα τοξοειδή (ή ατοξίνες)

του κορυνοβακτηριδίου της διφθερίτιδας και του κλωστοτριδίου του τετάνου και μόνο αντιγόνα της B. pertussis (όχι ολόκληρο τον μικροοργανισμό νεκρό, όπως τα παλαιότερα «ολοκυτταρικά» εμβόλια) γι' αυτό και καλείται «ακυτταρικό» κατά του κοκκύτη (acellular pertussis ή aP) εμβόλιο.

2α. TdaP = Εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης. Στη χώρα μας περιέχει και IPV και δύναται να χορηγηθεί μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Το TdaP συνιστάται να γίνεται για επαναληπτική δόση στην ηλικία των 11-12 ετών ή και αργότερα (μέχρι την ηλικία των 64 ετών) κατά προτίμηση όταν στην οικογένεια αποκτάται νεογέννητο. Συνιστάται να απέχει 5 χρόνια από το DTaP ή το Td για λιγότερες τοπικές αντιδράσεις, μπορεί όμως να χορηγηθεί με ελάχιστο μεσοδιάστημα και δύο ετών. Εάν δεν κυκλοφορεί το TdaP μόνο του (χωρίς IPV) χορηγείται το Td ενηλίκων. Οι υπόλοιπες δόσεις θα είναι κάθε 10 χρόνια με Td ενηλίκων.

2β. Td = Εμβόλιο κατά του τετάνου και της διφθερίτιδας με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης. Συνιστάται να γίνεται κάθε 10 χρόνια μετά τη χορήγηση του Tdap στην εφηβική ηλικία. Το εμβόλιο του τετάνου μπορεί να γίνεται διά βίου με ασφάλεια.

3. IPV = Ενέσιμο ενισχυμένο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας.

4. Hib = Συζευγμένο εμβόλιο κατά του αιμόφιλου τύπου β. Εάν η πρωτεΐνη σύζευξης είναι η PRP – OMP (πρωτεϊνικό σύμπλεγμα της εξωτερικής μεμβράνης του μηνιγγιτιδόκοκκου) τότε η 3η από τις 3 αρχικές δόσεις μπορεί να παραληφθεί και το σχήμα να είναι (2ος, 4ος και 12ος-15ος μήνας).

5. MCC = Συζευγμένο, πολυσακχαριδικό εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C. Συνιστάται η έναρξη εμβολιασμού σε ηλικία 2 μηνών και ακολουθείται σχήμα 3 δόσεων – οι 2 πρώτες δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών και επαναληπτική δόση σε ηλικία 15-18 μηνών. Σε περίπτωση έναρξης εμβολιασμού σε ηλικία > 12 μηνών, ακολουθείται σχήμα 1 δόσης.

6. PCV = Νεκρό, συζευγμένο, πολυσακχαριδικό, επταδύναμο εμβόλιο κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκου). Συνιστάται σ' όλα τα παιδιά ηλικίας 2-23 μηνών. Η τελευταία δόση (4η) γίνεται σε ηλικία ≥ 12 μηνών. Το εμβόλιο μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερη ηλικία και ίδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε υποσημειώσεις 6, 7 στο πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά που δεν εμβολιάσθηκαν στη βρεφική ηλικία, πίνακες 1 και 2). Στην τελευταία περίπτωση, οι επαναληπτικές δόσεις μπορεί να γίνονται και με το 23δύναμο

πολυσακχαριδικό μη συζευγμένο εμβόλιο (PPV).

6a. PPV = Μη συζευγμένο, πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23δύναμο) κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (πνευμονιοκόκκου). Συνιστάται για επαναληπτικές δόσεις σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή πνευμονιοκοκκική λοιμωξη (πίν. 3), εκτός από υγιή βρέφη και παιδιά ηλικίας 2-3 μηνών.

7. MMR = Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς. Χορηγείται στην ηλικία των 12-15 μηνών. Συνιστάται 2η δόση του εμβολίου στην ηλικία των 4-6 ετών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία αρκεί να απέχει 2 μήνες από την 1η δόση. Ο παιδίατρος πρέπει να ελέγχει αν έγινε ή όχι η 2η δόση και αν όχι χορηγείται η 2η δόση σε οποιαδήποτε ηλικία.

8. Var = Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της ανεμευλογιάς. Χορηγείται σ' όλα τα παιδιά στην ηλικία των 12-18 μηνών (κατά προτίμηση μετά τον 150 μήνα), αλλά και σ' οποιαδήποτε άλλη ηλικία εφόσον το άτομο δεν έχει νοσήσει. Συνιστάται 2η δόση του εμβολίου στην ηλικία των 4-6 ετών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία αρκεί να απέχει 2 μήνες από την 1η δόση. Ο παιδίατρος πρέπει να ελέγχει αν έγινε ή όχι η 2η δόση και αν όχι χορηγείται η 2η δόση σε οποιαδήποτε ηλικία.

9. HPV = Ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 9-26 ετών. Στη χώρα μας συνιστάται μόνο σε κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών αλλά και σε κορίτσια ηλικίας 15-26 ετών εάν δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους, εάν ήδη έχουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο, ιδιαίτερα αν έχουν αλλάξει 3-4 σεξουαλικούς συντρόφους). Στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο εμβόλια. Το ένα είναι διδύναμο και το άλλο τετραδύναμο. Και τα δύο εμβόλια περιέχουν τα ογκογόνα στελέχη 16 και 18. Το τετραδύναμο περιέχει επιπλέον δύο ακόμα τύπους ιών (6 και 11), που ασκούν προστατευτική δράση κατά των θηλωμάτων (κονδύλωμάτων). Το δοσολογικό σχήμα και για τα δύο εμβόλια περιλαμβάνει 3 δόσεις. Για μεν το διδύναμο οι δόσεις είναι 0-1-6 μήνες, ενώ για το τετραδύναμο είναι 0-2-6 μήνες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα ο γιατρός μπορεί να συνεχίσει τον εμβολιασμό, χωρίς να χάνονται οι προηγούμενες δόσεις. Τέλος, η συγχορήγηση του εμβολίου με άλλα εμβόλια έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ασφαλής μόνο όσον αφορά το εμβόλιο της ηπατίτιδας B.

10. Hep A = Αδρανοποιημένο ολοκυτταρικό εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας A. Χορηγείται σε οποιαδήποτε ηλικία άνω του ενός (1) έτους σε 2 δόσεις, με ελάχιστο μεσοδιάστημα 6 μηνών, καθώς και σε όλες τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για ηπατίτιδα A (πίν. 5).

11. BCG = Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της φυματίωσης. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (πίν. 3). Παράλληλα συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 1, 4-6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με BCG, **11a**) και στα ανεμβολίαστα παιδιά, στην ηλικία 11-12 ετών (όταν γίνεται η εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης, **11b**).

12. INFL = Αδρανοποιημένο ολοκυτταρικό ή ακυτταρικό (τμηματικό) εμβόλιο κατά της γρίπης που συνιστάται να γίνεται ετησίως, σε 1 δόση και σε ηλικία πάνω από 6 μήνες. Ενδείκνυται **μόνο** στα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να νοσήσουν σοβαρά από γρίπη. Παιδιά κάτω των 8 ετών που θα εμβολιασθούν για πρώτη φορά θα πάρουν 2 δόσεις εμβολίου ($0,25 \text{ ml} < 3 \text{ ετών}$ και $0,5 \text{ ml} \geq 3 \text{ ετών}$) με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.

Επίσης συνιστάται ετησίος εμβολιασμός όλων των υγιών ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών και των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών συνθηκών (π.χ., επιδημία, πανδημία) οι συστάσεις αλλάζουν.

Όλα τα παιδιά πρέπει να επισκέπτονται τον γιατρό τους στην ηλικία των 11-12 ετών (τέλος δημοτικού, έναρξη φοίτησης στο γυμνάσιο), ώστε να γίνεται έλεγχος της εμβολιαστικής τους κάλυψης και καταγραφή της στην ειδική σελίδα του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια μετά τον εμβολιασμό που επισημαίνει ο κλινικός γιατρός, πρέπει να αναφέρεται στον ΕΟΦ (να συμπληρώνεται η κίτρινη κάρτα).

Στους πίνακες 1 και 2 συνοψίζεται το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών για τα παιδιά που καθυστέρησαν να εμβολιαστούν.

Πίνακας 1. Πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών που δεν εμβολιάσθηκαν στη συντομότελη από το Εθνικό Πρόγραμμα ηλικία

Εμβόλιο	1η δύση ημερομηνία	2η δύση 1η-2η δύση ¹	3η δύση 2η-3η δύση ¹	3η-4η δύση ημερ/νία	4η δύση ημερ/νία	5η δύση 4η-5η δύση ¹
Ηπατίτιδας Β (Hep B) Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκυτ (DTaP)* Πολιομυελίτιδας IPV ³ Αιμόφλοιου τύπου β (Hib) ⁴ Μηνιγγιτιδοκόκκου C (MCC) ⁵ Πνευμονοκόκκου (7 δύναμο) (PCV) ⁶ Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) ⁷ Ανεψευλογίας (Var) ⁸ Ηπατίτιδας Α (Hep A) ⁹ Φυματιώσης (BCG) ¹⁰ Φυματινοαντιρρασης ¹¹ (Mantoux) Γρίπης (INFL) ¹²	4 εβδ 4 εβδ	4 εβδ 4 εβδ	3 μην 4 εβδ	4 εβδ 4 εβδ 4 εβδ 4 εβδ	6 μην 4 εβδ 8 εβδ 8 εβδ 8 εβδ	3-4 χρόνια

Πίνακας 2. Πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά ηλικίας 7-18 ετών που δεν εμβολιάσθηκαν στη συντομότελη από το Εθνικό Πρόγραμμα ηλικία

Εμβόλιο	1η δύση ημερομηνία	2η δύση 1η-2η δύση ¹	3η δύση ημερ/νία	2η-3η δύση ¹	3η-4η δύση ¹	4η δύση ημερ/νία
Ηπατίτιδας Β (Hep B) Διφθερίτιδας, Τετάνου (Td)	4 εβδ 4 εβδ	4 εβδ 4 εβδ	3 μην 6 μην	3 μην 6 μην	6 μην 5 χρόνια	
Tdap						6 μην
Πολιομυελίτιδας IPV						
Μηνιγγιτιδοκόκκου						
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) Ανεψευλογίας (Var) Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων Ηπατίτιδας Α (Hep A) Γρίπης (INFL)	4 εβδ 8 εβδ 4-8 εβδ 6 μην	4 εβδ				

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2

1. Χρονικό διάστημα από την προηγούμενη δόση.
2. Η 5η δόση μπορεί να παραληφθεί όταν η 4η γίνει μετά το 4ο έτος της ηλικίας. Ο εμβολιασμός συνεχίζεται με Td. Το TdαP γίνεται σε μία δόση στην εφήβεια, κατά προτίμηση σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από το Td (Βλέπε επεξηγήσεις 2a, 2b στην εικόνα 1).
3. Χορηγούνται 4 δόσεις IPV.
4. Γίνεται σε 2 δόσεις σε άτομα ≤ 12 μηνών ή σε 1 δόση στα μεγαλύτερα παιδιά. Εάν γίνει κάλυψη του βρέφους με 2 δόσεις σε ηλικία μικρότερη των 12 μηνών τότε γίνεται, μετά το 1o έτος, και μία επαναληπτική δόση. Δεν συνιστάται η χορήγηση του εμβολίου κατά του αιμόφιλου σε παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών, με εξαίρεση άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με σπληνεκτομή ή λειτουργική ασπληνία.
5. Εάν η έναρξη του εμβολιασμού γίνει σε ηλικία μεγαλύτερη των 12 μηνών, χορηγείται μία μόνο δόση MCC. Εάν οι πρώτες 2 δόσεις έγιναν σε ηλικία μικρότερη των 12 μηνών γίνεται μία 3η δόση.
6. Εάν η έναρξη του εμβολιασμού γίνει μέχρι την

ηλικία των 7 μηνών χορηγούνται 4 δόσεις του PCV κατά το σχήμα που αναφέρεται στην εικόνα 1 (η 4η δόση μέχρι την ηλικία των 18 μηνών).

Εάν η έναρξη γίνει μεταξύ 12ου και 23ου μήνα χορηγούνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6-8 εβδομάδες.

Εάν η έναρξη γίνει από τον 24o μήνα και μετά, στα υγιή παιδιά χορηγείται μία μόνο δόση. Στα ανοσοκατασταλμένα και σ' αυτά που ανήκουν γενικά στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις (πίν. 3) χορηγούνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6-8 εβδομάδες.

7. Η 2η δόση του MMR συνιστάται να γίνεται στην ηλικία των 4-6 ετών. Εάν όμως η έναρξη του εμβολιασμού γίνει σ' αυτή την ηλικία, η 2η δόση μπορεί να γίνει σύντομα με ελάχιστο μεσοδιάστημα 8 εβδομάδες.

8. Όταν ο εμβολιασμός κατά της ανεμευλογιάς γίνει σε ηλικία μεγαλύτερη των 12 ετών συνιστώνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών.

9. Βλέπε επεξηγήση 10 στην εικόνα 1.

10, 11. Βλέπε επεξηγήση 11 (11a, 11b) στην εικόνα 1.

12. Βλέπε επεξηγήση 12 στην εικόνα 1.

13. Μόνο για κορίτσια ηλικίας 15-26 ετών που δεν εμβολιάστηκαν στη συνιστώμενη ηλικία (βλέπε επεξηγήση 9 στην εικόνα 1).

Πίνακας 3. Άτομα με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις

- Μικρά παιδιά άνω των 2 ετών και ενήλικες >60 ετών
- Άτομα με συγγενείς αντισωματικές ανεπάρκειες (κυρίως έλλειψη της IgG2)
- Άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV
- Άτομα με επίκτητη ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας ή άλλης (εκτός του HIV) ιογενούς λοιμωχής
- Άτομα με μειονεκτική σπληνική λειτουργία ή ασπληνία, π.χ., με δρεπανοκυτταρική νόσο, με υπερσπληνισμό, με χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα
- Άτομα με νεφρωσικό σύνδρομο ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
- Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
- Άτομα με χρόνια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
- Άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες
- Άτομα με διαφυγή εγκεφαλονωτιάου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες

Πίνακας 4. Παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για φυματική μόλυνση/φυματίωση

- Μετανάστες από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη ενδημικότητας
- Καταυλισμοί αθιγγάνων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν με συνθήκες ομαδικής διαβίωσης
- Παιδιά με Mantoux (-) στην οικογένεια των οποίων υπάρχει άτομο με φυματίωση (θετικά πτύελα)
- Νεογάνα μητέρων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV (όχι βρέφη συμπτωματικά για AIDS)
- Νεογάνα, στο άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με φυματίωση (εμβολιάζονται κατά τη γέννηση)

Πίνακας 5. Ενδείξεις εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Α σε χώρες με χαμηλή και μέση ενδημικότητα

- Ταξιδιώτες
- Επαγγελματίες Υγείας
- Επαγγελματίες διακίνησης τροφίμων
- Προσωπικό Ιδρυμάτων
- Προσωπικό καθαριότητας δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
- Κλειστοί πληθυσμοί
- Ομοφυλόφιλοι – Τοξικομανείς
- Άτομα με χρόνια λοιμωχή με τον ιό της HB